



Jeudi 08 Septembre 2005

**Mon bébé a la diarrhée, que faut-il faire???**  
Thème : Conseils aux PARENTS

Diapositives: 1 à 9



diapositive 1



diapositive 2



diapositive 3



diapositive 4




diapositive 5



diapositive 6



diapositive 7



diapositive 8



diapositive 9

Posté par Martinot Dr A



ce diaporama vous intéresse ?  
Contactez-nous !


CHU LILLE



MedTools support :  
contact@esens.fr  
www.esens.fr




## Qu'est-ce que la diarrhée ?



- **les selles sont**
  - plus nombreuses
  - plus fréquentes
  - plus liquides
- **l'enfant perd de l'eau par les selles**


# Qu'est-ce que la gastro-entérite ?

- **une maladie due à un virus**
- **l'enfant a la diarrhée**
- **souvent il vomit**
- **parfois il a de la fièvre**



# Le risque est la déshydratation

- si l'enfant ne boit pas
  - si l'enfant vomit
  - si la diarrhée est très abondante
- alors il sort plus d'eau qu'il n'en rentre



# Le risque est la déshydratation

- si l'enfant ne boit pas
  - si l'enfant vomit
  - si la diarrhée est très abondante
- alors il sort plus d'eau qu'il n'en rentre





## Pour éviter une déshydratation grave




- dès que la diarrhée commence
- sans ordonnance
- en attendant le médecin
- Adiaril<sup>®</sup>, Alhydrate<sup>®</sup>, Blédilait R.O.<sup>®</sup>, Gallialyte<sup>®</sup>, GES 45<sup>®</sup>, Hydrigoz<sup>®</sup>, Lytren<sup>®</sup>, Picolyte<sup>®</sup>, Fanolyte<sup>®</sup>

# Respecter la dilution !

1 sachet



200 ml  
d'eau



# Comment donner la solution ?

## " L'enfant a soif "

- **proposer souvent à boire**  
(au début plusieurs fois par heure)
- **laisser boire à volonté**
- **sans limiter les quantités**
- **noter les quantités bues**



## **Deux conseils essentiels**

- **Si l'enfant ne boit pas et ne présente aucun signe inquiétant, c'est qu'il n'a pas soif**
  - lui proposer de nouveau un peu plus plus tard
- **Si l'enfant vomit :**
  - donner la solution bien fraîche (réfrigérateur)
  - donner par petites gorgées au début (cuillère)
  - puis augmenter les prises progressivement

## Deux remarques utiles

- **La persistance de selles liquides est normale :**
  - elle ne signifie pas que la solution est inefficace
  - son but unique mais essentiel est d'éviter la déshydratation
- **L'émission de selles lorsque l'enfant boit est un réflexe normal :**
  - "ce n'est pas la solution qu'il vient de boire qui repart immédiatement "

## Quand rappeler le médecin ?

- **si l'enfant est déshydraté**
- **si l'enfant continue de vomir malgré la solution**
- **si la diarrhée est incessante**
- **si elle dure plus de 5 jours**



## Reconnaître la déshydratation



- **l'enfant est triste ; il ne joue pas**
- **ses yeux sont creux**
- **sa respiration est rapide**
- **sa bouche est sèche**
- **il perd du poids**

## En cas de gastro-entérite

- si l'enfant boit le soluté
- si l'enfant boit assez
- si l'enfant mange  
(souvent un peu moins)

**Alors il va guérir en 3 à 5 jours**

